

LISTA DEFINITIVA DE LOS ACRIDOIDEOS DE CHILE

Por el
Dr. JOSE LIEBERMANN (*)

ORTHOPTERA

ACRIDODEA

ACRIDOIDEA

Familia TETRIGIDAE

- 1.—*Liolettix miserabilis* (Blanchard) Bolívar.

Gay, VI, (1851), 85.

Coquimbo (Gay); Valparaíso, Ovalle, Monte Patria, (E. P. Reed);
Cauquenes, Bulnes, Omué, (Liebermann y Zapata Castro); Colcha-
gua, Las Condes y Vitacura, sobre el río Mapocho, Santiago (Lidia
Valenzuela de Reed y Carlos S. Reed).

Familia PROSCOPIDAE

- 2.—*Cephalocoema flavirostris* (Blanchard) Kirby.

Gay, VI, (1851), 61.

Coquimbo, Temuco, Curicó, Santiago (Blanchard, Mello Leitao).

- 3.—*Epsigrypa chilensis* Mello Leitao.

Ver VII Internat. Kongr. Entom. I (1939),
302.

Coquimbo (Mello Leitao).

- 4.—*Anchotatus unaninus* Mello Leitao.

Monogr. Proscop. (1939) 368.

Valparaíso (Mello Leitao).

- 5.—*Anchocoema armaticollis* (Blanchard) Birabén.

Gay, VI (1851), 62.

Chile (Blanchard); Argentina, Mendoza (Mello Leitao).

- 6.—*Astroma asperum* (Philippi) Mello Leitao. Monogr.

Proscop. (1939), 379.

Illapel (Philippi).

(*) Acridólogo del Instituto de Investigaciones sobre la langosta de la Di-
rección de Sanidad Vegetal del Ministerio de Agricultura de la Argentina.

- 7.—*Astroma chloropteron* Charpentier.
Orth. descripta et depicta (1841) Pl. 4
Chile y Argentina (Mello Leitao, Charpentier)
- 8.—*Astroma compactum* Brunner v. Wattenfyl.
Verhadl. Zool. Bot. Ges. Wien XL (1890), 120
Chile y Argentina (Brunner, Mello Leitao, Birabén).
- 9.—*Astroma foliatum* Brunner v. Watt.
Verhadl. Zool. Bot. Ges. Wien. XL. (1890) 121.
Chile y Argentina (Brunner, Rehn, Mello Leitao)
- 10.—*Astroma granulosum* Brunner v. Watt.
Verhadl. Zool. Bot. Ges. Wien. XL (1890), 121.
Chile y Argentina.
- 11.—*Astroma striatum* (Blanchard) Kirby.
Gay, VI (1851), 60.
Coquimbo (Blanchard y Mello Leitao).
- 12.—*Astroma stuardoi* Mello Leitao.
Monogr. Proscop. (1939), 395.
Coquimbo (Mello Leitao).
- 13.—*Astroma uretai* Mello Leitao.
Monogr. Proscop. (1939), 397.
Pocillos (Talca), (Mello Leitao).
- 14.—*Hybasa coniceps* (Blanchard) Kirby.
Gay VI, (1851), 63.
Coquimbo, Cautín, Santiago, Aconcagua (Mello Leitao).
- 15.—*Hybasa occidentalis* (Westwood) Westwood.
Arcana Entomológica (1843), 53.
“Casi en todo Chile, entre Concepción y Coquimbo” (Mello Leitao),
Valparaíso (Liebermann).
- 16.—*Hybasa minuta* Mello Leitao.
Monogr. Proscop. (1939), 442.
Huente (Mello Leitao).

Familia **ACRIDIDAE**Subfamilia **Romaleinae**

- 17.—*Catreolus sulcaticollis* (Blanchard) Uvarov.

Gay VI, (1851) 66.

Coquimbo (Blanchard); Atacama, Santiago y Colchagua (Philippi); Cerro San Cristóbal, Tiltill, Vicuña, Chillán, Valparaíso, Reñaca, Bío-Bío, Malleco (Liebermann).

- 18.—*Catreolus ornaticollis* (Blanchard) Uvarov.

Gay VI, (1851) 66.

Concepción (Blanchard); Malleco (Bullock, col.); “Común en Chile” (E. C. Reed).

- 19.—*Conometopus ochraceus* Blanchard

Gay VI (1851) 68.

Coquimbo (Blanchard); La Serena (Liebermann).

- 20.—*Conometopus cristaticollis* Blanchard

Gay VI (1851) 69.

Coquimbo (Blanchard).

- 21.—*Aplatocris leprosa* (Bolívar) Scudder.

An. Soc. Esp. X (1881) 482.

“Norte de Chile” (Bolívar). No encontrada.

- 22.—*Antandrus viridis* (Blanchard) Stål.

Gay VI (1851) 74 (hembra).

- .—*Batrachopus tibialis* Blanchard.

Gay VI (1851) 82 (macho).

Coquimbo, Concepción (Blanchard); Valdivia (Philippi); Bío-Bío (E. C. Reed); Putaendo (Benjamín Olivares); Malleco (Bullock, col.); Tenglo (E. P. Reed); Collipulli (R. Gutiérrez).

Subfamilia **Cyrtacanthacrinae**

- 23.—*Tropidostethus angusticollis* (Blanchard) Philippi

Gay VI (1851) 65.

Chile (Blanchard); Valdivia (Philippi); Aysén (Ureta leg.); Llanquihue (Escuela Alemana de Puerto Varas); Villarrica (Liebermann); Collipulli (R. Gutiérrez).

- 24.—*Moluchacris obesa* (Philippi) Rehn.
Zeitschr. Gesamm. Naturw. XXI (1863) 243.
Santiago, Colchagua (Philippi).
- 25.—*Moluchacris cinerascens* (Philippi) Rehn.
Zeitschr. Gesamm. Naturw. XXI (1863) 242.
Santiago (Philippi); Concepción, Malleco (Rehn).
- 26.—*Moluchacris bufo* Rehn.
Trans. Amer. Ent. Soc. LXVIII (1942) 58.
Concepción, Valparaíso (Rehn).
- 27.—*Peplacris recutita* Rehn.
Trans. Amer. Ent. Soc. LXVIII (1942) 64.
Valparaíso (Rehn).
- 28.—*Tristira bergi* Bruner v. Watt.
Común Museo Nac. Buenos Aires, (1900) 236.
Filaret (Brunner la da como localidad argentina, pero es chilena y por esto incluyo aquí esta especie), Magallanes.
- 29.—*Tristira magellanica* (Bruner) Brunner.
Second Rep. Merch. Loc. Com. B. Aires. 1900 }
44.
Rehn la incluye en la acridiofauna de Chile (1942).
- 30.—*Bufoacris terrestris* Walker.
Cat. Spec. Dermap. Salt. Coll. Brit. Mus. V
Suppl. (1871) 81.
Magallanes (Liebermann); "Fuegia" (Philippi).
- 31.—*Uretracris lilai* Liebermann.
Rev. Soc. Ent. Arg. XI (1943) N. G. p. 405-
406, lám. XVIII.
Antofagasta, Ureta leg.

- 32.—*Schistocerca cancellata* (Serv.) Scudder.
Ins. Orth. (1839). 664.
(*Schistocerca paranensis* Burm. es la forma gregaria de la especie)
De Cautín a Tarapacá (Liebermann, Reéd, Lataste, Philippi, Porter, etc.) (“El langostón”).
- 33.—*Dichroplus maculipennis* (Blanchard) Liebermann.
Gay VI (1851) 72.
Bío-Bío, Malleco (E. C. Reed); Coquimbo (Blanchard); Malleco (Manuel Jesús Rivera); Aconcagua, Putaendo (Liebermann); Concepción, Ñuble, Colchagua, Santiago (C. S. Reed); Collipulli (R. Gutiérrez); (“La langosta brava”). Cauquenes (Brücher).
- 34.—*Dichroplus porteri* (Liebermann).
(En prensa).
Curicó (E. P. Reed); de Talca a Malleco (Liebermann).
- 35.—*Dichroplus elongatus araucanus* Liebermann.
(En prensa).
Casi todo Chile, de Cautín hasta Antofagasta (Liebermann).
- 36.—*Dichroplus vittiger* (Blanchard) Berg.
Gay VI (1851) 73.
Coquimbo y Santiago (Blanchard); Colchagua (Philippi); desde Concepción hasta Santiago (Liebermann).
- 37.—*Dichroplus democraticus* (Blanchard) Liebermann.
Gay VI (1851) 74.
Coquimbo (Blanchard); Santiago y Valdivia (Philippi); desde Cautín al Sur, hasta Chiloé (Liebermann).
- 38.—*Flamiruzia stuardoi* Liebermann.
Rev. Soc. Ent. Arg. XI (1943), N. 5, p. 400-402, lám. XVIII.
Río Claro, Talca (Flaminio Ruiz, leg.).
- Subfamilia **Chilacrinae**
- 39.—*Aucacris eumera* Hebard.
Ent. News XL (1929) 255.

Chile (Hebard); Región puneña, desde Santiago a Aysén (Liebermann); (Flaminio Ruiz, Ureta, Stuardo, Bullock, leg.).

40.—*Aucacris hebardi* Willemse.

Mitth. D. Ent. Ges. II (1931) 22.

Chile (Willemse). Probablemente es la anterior.

41.—*Philippiacris rabiosus* (Philippi) Liebermann.

Rev. Soc. Ent. Arg. XI (1943) N. G, p. 402-404, lám. XVIII.

42.—*Chilacris maculipennis* Liebermann.

Rev. Soc. Ent. Arg. XI (1943), N G, p. 408-409, lám. XVIII.

Material de Copiapó, M. Espinosa Bustos, leg.

43.—*Elasmoderus lutescens* (Blanchard) Saussure.

Gay VI (1851) 81.

No encontrada.

Subfamilia Acridinae

44.—*Rhammatocerus pictus* (Bruner) Saussure.

Sec. Rep. Loc. Com. Bs. Aires (1900) 37.

Lonquimay, por primera vez en Chile, F. Ruiz, leg. (Liebermann).

45.—*Scyllina signatipennis* (Blanchard) Rehn.

Gay VI (1851) 79

Desde Santiago hasta Chiloé (Blanchard, Philippi, Rehn, Liebermann, C. S. Reed).

46.—*Scyllina humilis* (Blanchard) Rehn.

Gay VI (1851) 79.

Igual distribución que la anterior.

47.—*Scyllina chilensis* (Saussure) Rehn.

Rev. Zool. Mag. (2) XIII, (1861) 318.

Especie de dudosa existencia, no hallada en este viaje.

Subfamilia Oedipodinae

- 48.—*Trimerotropis ochraceipennis ochraceipennis* (Blanchard)
Gay VI, (1851) 77.
Casi en todo Chile, hasta 3.000 metros sobre el nivel del mar.
- 49.—*Trimerotropis ochraceipennis reedi* Liebermann.
(En prensa).
Juan Fernández (Reed, leg.).
- 50.—*Trimerotropis atacamensis* (F. Philippi), Kirby
"Reisse in Atacama" (1860) 173.
Antofagasta y Tarapacá. (Materiales en el Museo Nacional de Historia Natural de Santiago) Liebermann.
- 51.—*Trimerotropis flavipennis* (Philippi) Kirby
Zeitschr. Ges. Naturw. XXI (1863) 240.
Corral, Concepción (Philippi). No encontrada.
- 52.—*Trimerotropis chloris* (Philippi) Kirby
Zeitschr. Ges. Naturw. XXI (1863) 241.
Valdivia (Philippi). No encontrada. Parece ser una *Scyllina*.
- 53.—*Trimerotropis irrorata* (Philippi) Kirby
Zeitschr. Ges. Naturw. XXI (1863) 241.
No encontrada. De dudosa existencia.
- 54.—*Trimerotropis rufipennis* Liebermann.
(En prensa).
Sibaya, 2.680 metros, Tarapacá (Museo Nacional de Historia Natural de Santiago).