

Nueva plaga insectil de las empastadas y sementeras¹

Leonidas Durán M.²

A la primera información escrita sobre esta plaga, aparecida en 1968 en *Simiente*: 38 (5-6): 11-12, debe agregarse ahora la identificación de la especie dañina, en base de muestras enviadas por el autor de esta nota, después de los estudios de Kenneth G. V. Smith, del Museo Británico de Londres y M. T. James, de Washington. Según el Dr. M. T. James es el Díptero:

¹Recepción manuscrito: 29 de julio de 1970.

²Dr. Agr. Prof. Entomología, Instituto de Defensa de las Plantas, Universidad Austral de Chile, Casilla 567, Valdivia, Chile.

Tana paulseni (Philippi) *Stratiomyidae*, *Chiromyzinae*. Agrega el Dr. James que *Tana* Read 1888 tiene prioridad como nombre genérico sobre *Lagarinus* Enderlein.

En cuanto a su condición de especie dañina el Dr. James dice que sería la única otra especie perjudicial en el mundo perteneciente a esta subfamilia *Chiromyzinae*, ya que de dos especies australianas del género *Inopus* (= *Altermetoponia*), dañinas a la caña de azúcar, una de ellas ha resultado una plaga de los céspedes al ser introducida en el área de San Francisco de California.